

Noticias médicas en resumen

El agente reductor de lipoproteínas(a)s no reduce los eventos cardiovasculares

Samantha Anderer

JAMA

Publicado en línea: 25 de septiembre de 2026

doi: 10.1001/jama.2026.14725

ícono relacionado ARTÍCULOS RELACIONADOS

El fármaco experimental **pelacarsen** no redujo el riesgo de eventos cardiovasculares adversos en un estudio de fase 3, a pesar de reducir los niveles de lipoproteínas(a) (Lp[a]), anunció el fabricante.

El ensayo Lp(a)**HORIZON de 7 años** incluyó a unas 8.300 personas con niveles altos de Lp(a) y enfermedades cardíacas preexistentes. Los participantes que recibieron inyecciones mensuales de **pelacarsen**, un oligonucleótido en fase de investigación, redujeron sus niveles de Lp(a) en comparación con los que recibieron placebo, pero el fármaco no redujo el riesgo de eventos cardiovasculares, incluyendo revascularización coronaria urgente que requirió hospitalización, infarto de miocardio no fatal, ictus no fatal y muerte cardiovascular.

La Lp(a) elevada *es un factor de riesgo cardiovascular hereditario* sin un tratamiento dirigido aprobado. Se pensaba que reducir la Lp(a) reduciría el riesgo cardiovascular residual más allá de la atención guiada por las directrices, según indicó el fabricante en un comunicado de prensa. Se están realizando ensayos clínicos de fase 3 para otros 2 agentes que reducen la Lp(a), **lepodisiran** y **olpasiran**, con un mecanismo de acción diferente al del pelacarsen.

Información del artículo

Publicado en línea: 25 de septiembre de 2026. doi:10.1001/jama.2026.14725